2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį

Burokėlių katalogas

That's bejo quality ▸ bejo.com

bejo

Raudonieji burokėliai

Beta vulgaris

Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai naudojama lietuviškoje virtuvėje. Neįsivaizduojame vasaros be šaltibarščių, o žiemos be silkės pataluose ar karštos barščių sriubos su džiovintais grybais...

Lietuvoje burokėliai žinomi nuo XVI a. 1588 m. jie buvo įtraukti į III Lietuvos statuto kainyną. Vakarų šalyse ši daržovė mažiau mėgstama. O ir vartojimo įpročiai skiriasi. Skandinavijoje, Pabaltijyje burokėliai dažniausiai vartojami perdirbti. Čia labai populiaru burokėlius virti, tarkuoti, pjaustyti kubeliais ar riekelėmis ir vakuumuoti, taip pat marinuoti. Dar vienas šio regiono išskirtinis bruožas – burokėliai turi būti rūgštesnio skonio. Tokios šalys kaip Didžioji Britanija, Prancūzija, JAV mėgsta ypač smulkius burokėlius (angl. baby beet) ir būtinai saldaus skonio. Na, o Centrinės Amerikos šalyse tiek vietiniuose turgeliuose, tiek prekybos centruose burokėliai dažniausiai parduodami ryšeliais.

Burokėlių pasėlių plotai pasaulyje, ha

Rusija	60 000
Ukraina	25 000
Brazilija	20 000
Lenkija	17 000
Centrinė Amerika	11 000
Turkija	2 500
JAV	2 500
Prancūzija	2 300
Didžioji Britanija	1 900
Meksika	1 750
Vokietija	1 300

Pagal www.vic.lt pateiktus duomenis, 2013 m. Lietuvoje buvo deklaruota 483 ha burokėlių pasėlių, 2012 m. - 431 ha, 2011 m. - 549 ha, 2010 m. - 335 ha.

Pablo F1

Populiariausi burokėliai mūsų asortimente. Derlingas vidutinio ankstyvumo hibridas, skirtas šviežių daržovių rinkai, perdirbimui, sandėliavimui ir smulkių burokėlių auginimui. Šakniavaisiai apvalūs, vidutinio dydžio, vienodos formos, geros prekinės išvaizdos. Minkštimas sodrios tamsiai raudonos spalvos, be koncentrinių žiedų, sultingas. Odelė lygi ir švelni. Lapija vidutinio stambumo, lapkočiai ploni. Iš kitų burokėlių išsiskiria plonesne, smulkesne pagrindine šaknimi ir mažesne skrotele, todėl idealiai tinka virtų ir vakuume supakuotų burokėlių gamybai. Verdant minkštimas neišblunka, spalva nekinta, minkštėja tolygiai, todėl tai vieni populiariausių perdirbimo burokėlių Europoje. Cukrų ir betanino kiekis vidutinis. Galima sėti anksti, burokėliai atsparūs žyduolių formavimuisi. Vėlesnės sėjos derlius tinka laikymui. Per sausras patartina laistyti. Auginant ypač smulkius šakniavaisius (angl. baby beet) rekomenduojama sėti apie 1,5 mln. sėklų/ha.

Boro F1

Organic

Vidutinio ankstyvumo burokėliai išvesti auginti kontinentinio klimato sąlygomis (didelė paros ir metų temperatūrų amplitudė, nedidelis kritulių kiekis, mišrūs metų laikai). Veislės skirtos kontinentiniam klimatui yra ypač pakančios drėgmės trūkumui ir aukštoms temperatūroms bei atsparios ligoms. Boro F1 šakniavaisiai apvalūs, lyginant su Pablo F1 burokėliais – šiek tiek stambesni, drūtesni, su storesne ir ilgesne pagrindine šaknimi. Odelė lygi ir tvirta. Minkštimas sodrios tamsiai raudonos spalvos, sultingas, be ruožų ir sukietėjusio pluošto žiedų. Skirtingai nei Pablo F1, šie burokėliai turi stambią ir vešlią lapiją, platesnę kerpę. Šakniavaisiai sukaupia daug sausųjų medžiagų ir cukrų. Burokėliai atsparūs sausroms, grybinėms ligoms, ypač lapų rudmargei (cerkosporozei). Tinka perdirbti bei vartoti šviežius. Puikiai sandėliuojasi. Vegetacijos trukmė 117 dienų nuo sudygimo. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų.

Bettollo F1

Vieni iš naujausių burokėlių mūsų asortimente. Burokėlių Boro F1 tipo hibridas. Šakniavaisiai apvalūs, tvirti, su stambesne ir ilgesne pagrindine šaknimi, tankesnėmis šoninėmis šaknelėmis. Minkštimas sodrios, tamsiai raudonos spalvos, ištisinis, be koncentrinių žiedų, labai gero skonio, sultingas. Odelė lygi ir švelni. Lapija vešli, stipri, tvirta ir sveika. Skrotelė vidutinio dydžio. Sukaupia daugiausia sausųjų medžiagų ir cukrų. Bettollo F1 užsirekomendavo kaip vieni saldžiausių burokėlių mūsų asortimente. Atsparūs sausroms. Tinka vartoti šviežius, perdirbti, sandėliuoti. Vegetacijos trukmė 117 dienų nuo sudygimo.

Rocket

Derlinga vidutinio vėlyvumo veislė. Šakniavaisiai cilindro formos, tolygios tamsiai raudonos spalvos, užauga 13 – 17 cm ilgio ir 4 – 5 cm skersmens. Minkštimas tamsiai raudonas, be ryškių ruožų, sultingas. Odelė lygi ir plona. Lapai statūs ir stiprūs, geras atsparumas žyduolių formavimuisi. Tinka šviežiam vartojimui, konservavimui ir sandėliavimui. Rekomenduojama auginti lysvėse ir sėti 400 – 600 tūkst. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 130 dienų nuo sudygimo.

Alto F1

Labai derlingas vidutinio vėlyvumo hibridas, išauginantis cilindro formos šakniavaisius. Šakniavaisiai ilgi, vienodos formos, gražios tamsiai raudonos spalvos, lygia ir plona odele. Minkštimas sultingas, puikaus skonio, be sukietėjusio pluošto žiedinių intarpų. Greitai išverda, išvirę išlaiko ryškią ir intensyvią spalvą bei išskirtinai švelnų ir saldų skonį. Lapai vešlūs, statūs, šaknys giliai įsišakniję, todėl sausros jiems nėra itin pavojingos. Skirti auginti šviežų daržovių rinkai, perdirbimui riekelėmis, konservavimui ir ilgam sandėliavimui. Labai gražiai atrodo nuplauti. Rekomenduojama auginti lysvėse ir sėti 500 – 650 tūkst. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 125 dienos nuo sudygimo.

Taunus F1

Šakniavaisiai cilindriniai, vidutinio ilgio, vienodos formos, nelinkę išsikraipyti, lygia ir glotnia odele. Minkštimas sodrios, tamsiai raudonos spalvos, be koncentrinių žiedų, skanus ir sultingas. Didelis betanino kiekis, todėl puikiai tinka raudonajam glikozidiniui maisto dažikliui gaminti. Lapija kompaktiška, stati, skrotelė nedidelė. Burokėliai atsparūs žyduolių formavimuisi. Tinka vartoti šviežiai, perdirbti ir laikyti per žiemą. Rekomenduojama auginti lysvėse ir sėti 400 – 800 tūkst. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 127 dienos nuo sudygimo.

Bejo Zaden BV atstovė Lietuvoje UAB "Aista"
Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269
Mob: 8 689 73688. Tel/Faks: 8 37 332122
El.p. info@aista.lt. www.aista.lt