Morkos
2016-2018

That's bejo quality ▸ bejo.com

bejo

Mokum F1

Ankstyviausios ir skaniausios

That's bejo quality ▸ bejo.com



Ankstyvos Nanto tipo morkos

Daucus carota L.

Mokum F1 ▸ Naujiena

Ankstyviausios Nanto/Amsterdamo tipo morkos. Europoje šios morkos ypač išpopuliarėjo daržininkų mėgėjų tarpe. Šakniavaisiai cilindro formos, bet plonesni nei įprastų Nanto tipo morkų, 18-20 cm ilgio, labai maža šerdele. Morkos pamėgtos dėl ypatingo sultingumo, saldumo ir traškumo, todėl raunamos pirmiausiai ir vartojamos kaip sveikas, gaivus užkandis, taip pat šviežioms salotoms ir pirmosioms sultims gaminti. Derlių galima parduoti ir ryšeliais. Nedidelės morkytės (angl. „Baby carrot“) ypač mėgstamos vaikų, jas galima rauti jau po 50-60 dienų. Jei norite turėti itin ankstyvą derlių, šias morkas galite sėti iš rudens. Rekomenduojama sėti 1,2-1,5 mln. sėklų/ha, o norint auginti nedideles morkytes, sėjos normą reikia didinti iki 5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė apie 75-85 dienos.

Napoli F1

Ankstyvos morkos skirtos pačiam ankstyviausiam derliui lauke ir šiltnamiuose bei derliui parduodamam ryšeliais. Šios morkos dėl savo ankstyvumo ir skonio jau daug metų yra vienos populiariausių tarp daržininkų mėgėjų visoje Europoje. Greitai auga ir esant žemesnei temperatūrai. Pirmąjį derlių galima pradėti rauti jau po 60 dienų. Šakniavaisiai anksti įgyja būdingą vidaus ir išorės spalvą, cilindro formą ir saldų skonį. Didelis karotino kiekis. Dėl tvirtų, trumpų lapų lengva surišti į ryšelius. Dėka sveikos ir stiprios lapijos tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Vasarą galima šakniavaisius parduoti nupjovus lapus. Ilgas derliaus nuėmimo laikotarpis, šakniavaisiai nelinkę trūkinėti. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė apie 90 dienų.

Nominator F1

Nanto tipo morkos ankstyvumu panašios į seniai žinomą ir populiarią veislę Napoli F1. Šakniavaisiai labai anksti įgyja ryškią spalvą ir saldų skonį, o trumpi ir stiprūs lapai leidžia juos lengvai surišti į ryšelius. Idealiai tinka pačiam ankstyviausiam derliui ryšeliuose, tačiau nesibaiminant derlių galima nuimti ir vasaros metu, nes derliaus nuėmimo laikotarpis yra ilgas, morkos nelinkę trūkinėti, nepraranda skonio ir išvaizdos, puikiai tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Visiškai subręsta maždaug po 3 mėnesių nuo sėjos. Morkos atsparios jarovizacijai, jas galima sėti iš rudens. Rekomenduojama auginti lengvose, gerai įdirbtose dirvose, sėjant 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 95 dienos.

Norwich F1

Ankstyvos Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai vidutinio dydžio, cilindro formos, labai lygūs, ryškios spalvos ir skanūs. Lapija kompaktiška, stati. Ši veislė labai pasiteisino tuose regionuose, kur praktikuojama rudeninė sėja. Rekomenduojama sėti 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 96 dienos.

Namdal F1

Ankstyvos Nanto tipo morkos, kurias galima auginti tiek pačiam ankstyviausiam, tiek vasaros derliui. Auginant derliui ryšeliais, pradeda derėti iškart po pačių ankstyviausių veislių, o produkcija būna puikios kokybės prilygstanti vėlyvoms veislėms. Šakniavaisiai lygūs, cilindro formos, buku galu, sodrios spalvos, atsparūs trūkinėjimams. Tinka plauti ir pakuoti. Lapai tvirti, statūs, ne itin jautrūs grybinėms ir bakterinėms ligoms. Puikiai tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Kviečiame išbandyti šią veislę, auginant produkciją labai reikliems vartotojams. Rekomenduojama sėti 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 97 dienos.

Norwalk F1

Ankstyvos morkos skirtos tiek ryšelių, tiek ankstyvajam šakniavaisių derliui. Morkos cilindro formos, buku galu, priklausomai nuo pasėlio tankumo gali būti trumpos arba vidutinio ilgumo. Sukaupia daug cukrų ir karotino. Derliaus nuėmimo laikotarpis gana ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali išbūti dirvoje neprarasdamos kokybės. Lapija kompaktiška, stati, tvirta. Rekomenduojama sėti 0,8-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 98 dienos.

Norfolk F1 ▶ Naujiena

Naujos Nigel F1 tipo morkos. Šakniavaisiai vidutinio ilgumo, cilindro formos, buku galiuku, labai lygūs, atsparūs trūkinėjimams. Lapija stati, tvirta, išsiskiria sveikumu. Vegetacijos trukmė 109 dienos.

That's bejo quality ▸ bejo.com

bejo

Vidutinio ankstyvumo Nanto tipo morkos

Daucus carota L.

Nigel F1

Vidutinio ankstyvumo universalios paskirties Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos, patrauklios spalvos, atsparūs trūkinėjimams, išsiskiria sultingumu ir saldumu. Formuojasi greitai, sparčiai priauga svorio. Tinka perdirbimui griežinėliais ir užšaldymui. Nuplautos morkos ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą. Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui, nes lapija tvirta, stipriai laikosi prie šaknies. Tai veislė tapusi standartu vidutinio ankstyvumo Nanto tipo morkų grupėje. Sėjos ankstyvumą rekomenduojama tikslinti pagal derliaus paskirtį. Vėlesnės sėjos derlius puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,9-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 110 dienų.

Newcastle F1

Vidutinio ankstyvumo morkos ypač atsparios trūkinėjimams. Šakniavaisiai cilindro formos, buku galiuku, lygūs, idealiai tinka plovimui ir pakavimui į smulkias pakuotes (1 kg polietileninius maišelius, dėžutes ir pan.). Derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali išbūti dirvoje neprarasdamos kokybės. Vėlesnės sėjos derlius tinka sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,9-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 110 dienų.

Newcastle F1

Nairobi F1

Vidutinio ankstyvumo Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai sodrios spalvos, lygūs, cilindro formos, nežymiai smailėjančiu galiuku, šiek tiek trumpesni nei standartinis Nanto tipo morkų ilgis. Ypač atsparūs mechaniniams pažeidimams ir trūkinėjimui. Puikus, saldus skonis išliekantis net ir po ilgo sandėliavimo. Išskirtinis bruožas – didžiausia pirmos klasės morkų išeiga. Šiuo metu tai populiariausios plovimo ir pakavimo į nedideles pakuotes morkos Didžiojoje Britanijoje ir Izraelyje. Rekomenduojama auginti lengvesnėse dirvose, sėjant 0,9-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 110 dienų.

Napa F1

Morkos išvestos sukryžminus Nanto tipo liniją su amerikietiškąja Imperator. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi, lygūs, intensyvios ir ryškios spalvos, labai vienodi savo forma ir dydžiu, buku galiuku. Morkos formuojasi ir auga greitai. Didelis beta karotino kiekis. Puikiai tinka pardavimui ryšeliais, taip pat galima plauti ir pakuoti į polietileno maišelius bei perdirbti griežinėliais. Idealiai tinka perdirbimui užšaldant. Morkos nereiklios dirvožemiui, tačiau dirvą rekomenduojama įdirbti giliai ir suformuoti vagas arba lysves. Napa F1 išsiskiria dideliu atsparumu lapų ligoms ypač tikrajai miltligei (Erysiphe heraclei) ir alternariozei. Morkos auginamos pagrindiniam derliui ir sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 115 dienų.

Nantes 5 - Samson

Gerai žinoma, patikima, vidutinio ankstyvumo Nanto tipo veislė. Šakniavaisiai cilindro formos, buku galiuku, silpnai išreikšta šerdimi, ryškios išorinės ir vidinės spalvos, vidutiniškai 16-20 cm ilgio ir 100-150 g svorio, saldūs. Palyginti didelis sausųjų medžiagų kiekis. Tinka šviežiam vartojimui, perdirbimui ir ilgesniam sandėliavimui. Vegetacijos trukmė 112 dienų. Dėmesio: sėklos parduodamos pakuotėse po 50 g ir 500 g, hektarui užsėti reikia 1,5-1,8 kg sėklų.

Natuna F1 ▶ Naujiena

Naujos vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos. Puikūs rezultatai auginant kontinentinio klimato sąlygomis. Šakniavaisiai cilindro formos, 18-20 cm ilgio, lygūs, tinka plovimui. Lapija labai sveika, stipri, tamsiai žalios spalvos. Vėlesnės sėjos derlius tinka ilgam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 117 dienų.

That's bejo quality ▸ bejo.com

bejo

Vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos

Daucus carota L.

Naval F1

Vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos skirtos auginti kontinentinio klimato sąlygomis (didelė paros ir metų temperatūrų amplitudė, nedidelis kritulių kiekis, mišrūs metų laikai). Veislės skirtos kontinentiniam klimatui yra ypač pakančios drėgmės trūkumui ir aukštoms temperatūroms bei atsparios bakterinėms ligoms. Naval F1 išsiskiria ypač dideliu atsparumu tikrajai miltligei (Erysiphe heraclei). Šakniavaisiai lygūs ir labai vienodi, cilindro formos, buku galu. Subrendę morkos būna 22-25 cm ilgio, tinka plovimui ir pakavimui. Lapija tvirta, stati, tamsiai žalios spalvos, atspari ligoms, stipriai laikosi prie šaknies. Puikus balansas tarp lapų ir šakniavaisio ilgio. Esant poreikiui morkas galima parduoti ir ryšeliais. Šiek tiek vėlesnės sėjos derlius puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 116 dienų.

Nevis F1

Universalios paskirties Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi, lygūs, sodrios spalvos, išsiskiria kokybe. Didelė sulčių išeiga. Tinka plovimui ir pakavimui. Vėlesnės sėjos derlius puikiai tinka sandėliavimui. Lapija tvirta, vešli, atspari ligoms ypač alternariozei. Rekomenduojama auginti lengvesnėse dirvose. Išskirtinis šios veislės bruožas – didžiausia pirmos klasės morkų išeiga. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 118 dienų.

Nectar F1

Morkos ypač tinkamos auginti sausomis, karštomis vasaromis. Labai derlingos. Labai geras atsparumas grybelių sukeliamoms ligoms, alternariozei, taip pat Xantomonas rūšies bakterijoms. Atsižvelgiant į tokį atsparumą, rekomenduojama auginti ekologiniuose ūkiuose. Šakniavaisiai ilgi, stori, cilindro formos, sodrios spalvos, labai saldūs ir sultingi. Nemėgsta drėgmės pertekliaus ir užmirkusių dirvų. Gerai auga lengvose dirvose. Rekomenduojama auginti šviežiam vartojimui ir laikymui, taip pat sultims spausti. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti 0,8-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 120 dienų.

Nirim F1

Vidutinio vėlyvumo Nanto tipo morkos išsiskiriančios savo derlingumu. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi ir lygūs, sodrios išorinės ir vidinės spalvos, maža, plona vidine šerdimi, sultingi. Formuojasi greitai, sparčiai priauga svorio. Tinka perdirbimui užšaldant. Lapai sveiki, tvirti, derlių galima nuimti mechanizuotai. Vėlesnės sėjos derlius tinka sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 117 dienų.

Newhall F1

Universali vidutinio vėlyvumo veislė išsiskirianti ypač kokybiška produkcija. Šakniavaisiai cilindro formos, buku galu, ypač lygūs ir glotnūs, sodrios spalvos, sukaupia daug cukrų. Nelinkę peraugti, dažniausiai morkų ilgis neviršija 24 cm. Tinka plovimui, sulčių spaudimui ir perdirbimui griežinėliais. Derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali stovėti dirvoje neprarasdamos kokybės. Puikiai tinka ilgam sandėliavimui. Lapija vešli, tvirta, atspari grybinėms ir bakterinėms ligoms. Rekomenduojama sėti 1,0-1,5 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 118 dienų.

Naval F1

Norway F1 ▶ Naujiena

Naujos Nerac F1 tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos, vienodo didumo, lygūs, atsparūs trūkinėjimams. Šios veislės privalumas ir išskirtinis bruožas - labai sveika, tvirta lapija. Tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui ir plovimui. Puikiai sandėliuojasi. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 130 dienų.

That's bejo quality ▸ bejo.com

bejo



Vėlyvos Nanto tipo morkos

Daucus carota L.

Nipomo F1

Vėlyvos morkos išsiskiriančios savo derlingumu. Šioje veislėje firmai Bejo pavyko sutelkti daug teigiamų savybių, tokių kaip šakniavaisių lygumas, ryški spalva bei geresnis lapų atsparumas grybinėms ir bakterinėms ligoms. Šakniavaisiai išsiskiria patrauklia prekine išvaizda, vienodu didumu. Morkos ypač atsparios mechaniniams pažeidimams, puikiai atrodo nuplautos ir ilgai išsaugo gražią spalvą. Auga giliai dirvoje, neturi polinkio „išlipti" į paviršių. Sunkiose dirvose morkos nesutrumpėja. Tinka ilgam sandėliavimui. Gerai tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 127 dienos.

Niland F1

Vėlyvos Nanto tipo morkos, kurių paskirtis labai panaši į Nerac F1. Šakniavaisiai šiek tiek ilgesni nei Nerac F1 morkų, lygūs, labai vienodi, užauga 100-200 g svorio. Lapai vešlesni, statūs, tvirtai laikosi prie šaknies. Derliaus nuėmimo laikotarpis ilgas, subrendę morkos kelias savaites gali stovėti dirvoje neprarasdamos kokybės. Morkos atsparios trūkinėjimui ir pažeidimams derliaus nuėmimo, plovimo ir pakavimo metu. Plautos morkos išsiskiria savo lygumu, glotnumu ir ilgai išsaugo gražią spalvą. Veislė gerai toleruoja didesnį pasėlio tankumą. Rekomenduojama stambiems ūkiams, kurie yra visiškai mechanizavę gamybos ciklą. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 131 diena.

Narbonne F1

Vėlyviausios Nanto tipo morkos mūsų asortimente. Galima auginti ir šviežių daržovių rinkai, ir ilgam sandėliavimui, ir perdirbimui griežinėliais bei sultims. Šakniavaisiai labai vienodi savo forma ir dydžiu, cilindro formos, lygūs, intensyvios išorinės ir vidinės spalvos, saldūs ir sultingi. Sukaupia daug karotino. Lapija tvirta, atspari ligoms. Derlių galima nuimti mechanizuotai. Morkos labai atsparios lūžinėjimui, todėl po derliaus nuėmimo bendros produkcijos išeiga visad būna didesnė. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 135 dienos.

Nerac F1

Morkos rekomenduojamos ūkininkams, kurie nori aprūpinti šviežių daržovių rinką žiemos ir pavasario laikotarpiu. Šakniavaisiai gražios cilindro formos, ilgi, vienodo didumo, užauga 100-130 g svorio, skanūs, sultingi ir saldūs, ypač atsparūs pažeidimams mechaninio derliaus nuėmimo, morkų plovimo ir pakavimo metu. Nuimant derlių mechanizuotai, nuostoliai būna minimalūs. Morkos krisdamos į dėžes nesutrūkinėja, o lapai yra pakankamai stiprūs, kad raunant neatitrūktų nuo šakniavaisio. Puikiai sandėliuojasi. Ilgai sandėliuojamų morkų kokybė nepablogėja, jos išsaugo šviežumą, spalvą ir skonį. Morkos gražiai atrodo nuplautos, ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą. Ši veislė priskiriama derlingiausioms Nanto grupėje. Nerac F1 jau daug metų Lietuvoje ir Vakarų Europos šalyse yra viena populiariausių veislių šviežių morkų rinkoje po ilgo sandėliavimo. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 130 dienų.

Belgrado F1

Vidutinio ankstyvumo Bangor F1 tipo morkos. Labai greitai auga. Šakniavaisiai cilindro formos, į galą nežymiai plonėjantys, ilgi ir stambūs, užauga iki 300 g svorio. Šerdis nedidelė. Ryški spalva ir puikus skonis. Labai tinka sultims, šviežioms salotoms, o pasėjus anksti – pardavimui ryšeliais. Stiprūs, sveiki lapai atsparūs cerkosporozei, alternariozei bei bakterijų sukeliamoms ligoms. Puikiai tinka mechanizuotam derliaus nuėmimui. Vėlesnės sėjos derlius tinka 4-5 mėnesių sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 111 dienų.

That's bejo quality ▸ bejo.com

Berlikum tipo morkos

Daucus carota L.

Niagara F1

Labai derlingos Nanto/Berlikum tipo morkos. Šakniavaisiai auga greitai, yra ilgi, stori, cilindro formos, lygūs, sodrios spalvos. Ypač tinka sultims spausti, sulčių išeiga iš 1 kg morkų siekia 520-570 ml. Morkos atsparios lūžinėjimui mechaninio derliaus nuėmimo metu. Gerai pakelia drėgmės trūkumą bei sausas, karštas vasaras. Esant poreikiui derlių galima pradėti rauti anksti ir parduoti ryšeliais, nes šakniavaisiai susiformuoja greitai, anksti įgyja būdingą spalvą ir sparčiai auga. Veislė nereikli dirvožemiui. Rudeninis derlius tinka trumpam sandėliavimui. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 100 dienų.

Nayarit F1

Nanto/Berlikum tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos, labai lygūs, sodrios spalvos. Sukaupia daug cukrų, karotino ir mineralinių medžiagų. Veislė išvesta auginti kontinentinio klimato sąlygomis, gerai pakelia laikiną drėgmės trūkumą bei aukštą oro temperatūrą. Lapija tvirta, stipri, atspari alternariozei ir cerkosporozei. Veislė universali, plačios paskirties. Galima auginti pardavimui ryšeliais ar vasaros derliui, taip pat tinka ir vėlyvai sėjai, o rudeninis derlius puikiai išsilaiko ilgiau sandėliuojamas. Tinka plovimui, ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą. Rekomenduojama sėti 1,0-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 101 diena.

Baltimore F1

Berlikum tipo morkos, anksčiau buvusių populiarių morkų Nandrin F1 atitikmuo. Priskiriamos pačioms ankstyviausioms šio tipo morkoms. Gali būti auginamos pirmųjų šviežių morkų derliui ar ankstyvajam pardavimui dideliais ryšeliais. Tinka plovimui, ilgai išsaugo gražią blizgančią spalvą. Šakniavaisiai užauga dideli, sultingi ir intensyvios spalvos, todėl taip pat šias morkas rekomenduojama auginti ir perdirbimui - salotų gamybai ar sultims spausti. Sulčių išeiga iš 1 kg morkų siekia 500 ml. Auga labai greitai ir intensyviai, tad galima auginti ir kaip antrąjį derlių. Vėlesnės sėjos derlius tinka ilgesniam sandėliavimui. Išaugina stiprius, sveikus, tamsiai žalius lapus, kurie itin atsparūs grybelių ir bakterijų sukeliamoms ligoms. Puikiai prisitaiko prie įvairių tipų dirvožemio. Rekomenduojama sėti 0,9-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 103 dienos.

Bangor F1

Organic

Universalios paskirties nepaprastai derlingos Berlikum tipo morkos. Galima auginti ankstyvajam derliui, nes auga labai greitai ir intensyviai. Auginant ankstyvajam derliui, rekomenduojama sumažinti sėklų kiekį ir sėti rečiau. Ilgus, cilindro formos, gražios spalvos šakniavaisius galima naudoti sulčių gamybai. Šakniavaisiai turi būdingą ilgą, vos įžiūrimą šerdį, yra atsparūs pažeidimams ir lūžinėjimui, užauga iki 400 g svorio. Lapai vešlūs, tvirti, atsparūs ligoms. Daugelis morkų augintojų teikia šiai veislei pirmenybę, nes morkas galima auginti ir perdirbimui, ir šviežių daržovių rinkai, o derlius gali viršyti 100 t/ha. Rudens derliui ir laikymui skirtas Bangor F1 morkas reikia sėti vėliau, nuo gegužės 20 d. iki birželio 10 d. Dėmesio: galima užsisakyti ir sertifikuotų ekologiškų sėklų. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 110 dienų.

Berlin F1

Vidutinio ankstyvumo Berlikum tipo morkos. Šakniavaisiai cilindro formos, ilgi ir stambūs (užauga iki 250 g svorio), sultingi, saldūs, ryškios spalvos. Rekomenduojama sulčių gamybai, sulčių išeiga iš 1 kg morkų siekia 550-560 ml. Taip pat tinka šviežioms salotoms gaminti. Vėlesnės sėjos derlius puikiai sandėliuojasi 4-5 mėnesius. Rekomenduojama sėti 0,8-1,2 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 113 dienų.

Berlicumer 2 - Romosa

Derlinga vidutinio vėlyvumo Berlikum tipo veislė skirta rudens derliui. Šakniavaisiai stambūs, cilindro formos, buku galiuku, lygūs, saldūs. Ryški vidinė ir išorės spalva. Morkos stambios, tvirtos, netrūkinėja ir nelūžinėja. Tinka ilgam sandėliavimui. Puikiai prisitaiko prie įvairių tipų dirvožemio. Vegetacijos trukmė 127 dienos. Dėmesio: sėklos parduodamos pakuotėse po 50 g ir 500 g, hektarui apsėti reikia 1,2-1,5 kg sėklų.

Šantane tipo morkos

Daucus carota L.

Cupar F1

Universalios Šantane tipo morkos išsiskiriančios derlingumu. Sėjant tankiai, suformuoja smulkesnes morkas skirtas šviežiam vartojimui, o sumažinus sėklų kiekį ir sėjant retai, morkos užauga didelės, skirtos perdirbimui. Šakniavaisiai vienodo didumo, lygūs, puikios spalvos, skanūs ir sultingi, sukaupia daug cukrų. Tinka ilgam laikymui ir perdirbimui (sultys, šaldymas). Veislė nereikli dirvožemiui. Rekomenduojama sėti 0,8-1,0 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė, priklausomai nuo sėjos tankumo, 110-130 dienų.

Canada F1

Viena populiariausių Šantane tipo veislių. Morkos ryškios spalvos, labai saldžios ir sultingos, daugiausia naudojamos perdirbimui – sulčių ir tyrelių gamybai. Sulčių išeiga iš 1 kg morkų siekia 500-550 ml. Tinka ir užšaldymui. Šakniavaisiai lygūs, tolygios spalvos, viršus nelinkęs pažaliuoti, gali užaugti iki 500 g svorio, o derlius siekti 120 t/ha. Kūgio forma leidžia iki minimumo sumažinti nuostolius skutant mechaniniu būdu. Lapai stiprūs, vešlūs, atsparūs alternariozei. Veislė nereikli dirvožemiui, morkos gerai auga ir sunkiose dirvose. Nors morkos vėlyvos, tačiau pasėjus anksti pavasarį, derlių galima imti jau rugpjūčio pabaigoje. Vėlyvas derlius puikiai sandėliuojasi. Rekomenduojama sėti 0,8-1,0 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė, priklausomai nuo sėjos tankumo, 125-135 dienos.

Cupar F1



Mello Yello F1

Derlingos geltonos spalvos morkos

That's bejo quality ▸ **bejo.com**

bejo

Įvairių atspalvių morkos

Daucus carota L.

Purple Haze F1

Labai įspūdingos ir originalios išvaizdos Nanto tipo morkos. Šakniavaisiai ilgi, šiek tiek kūgiški, tamsios purpurinės spalvos, šerdis oranžinė, skonis būdingas morkoms. Violetinės spalvos morkose yra mėlynai violetinis pigmentas iš pigmentų klasės vadinamos antocianinais. Šie pigmentai veikia kaip antioksidantai saugantys organizmą nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, taip pat padeda užkirsti kelią širdies ligoms, lėtina kraujo krešėjimą. Tai gera žaliava natūraliems maistiniams dažikliams gaminti. Taip pat rekomenduojama užšaldymui griežinėliais ir, dėka dekoratyvios išvaizdos, salotų spalvos paįvairinimui. Dėmesio: ši veislė mažiau atspari grybinėms ligoms, tad priežiūra turi būti gerokai intensyvesnė. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 95 dienos.

Mello Yello F1

Labai derlingos Nanto/Berlikum tipo morkos ilgais geltonais šakniavaisiais. Geltonose morkose yra ksantofilų grupės pigmento liuteino, kuris saugo mūsų akis nuo ultravioletinių spindulių. Tai pigmentas panašus į beta karotiną, tik beta karotinas morkoms suteikia oranžinę spalvą, o liuteinas - geltoną. Morkos šiek tiek kūgiškos, vienodo didumo, lygios, tolygios spalvos. Tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui. Pasėjus anksti, morkas galima parduoti ryšeliais. O pasėjus gegužės pabaigoje – birželio pradžioje apie 1,5 mln. sėklų/ha tankumu, tinka perdirbimui griežinėliais. Intensyvią geltoną spalvą morkos įgyja rudenį. Sandėliuojasi trumpai, geriau saugyklose, šaldytuvuose. Lapija tvirta ir vešli, atspari grybinėms ir bakterinėms ligoms. Priklausomai nuo sėjos tankumo, vegetacijos laikotarpis trunka 115-130 dienų.

Purple Haze F1

Mello Yello F1

Purple Haze F1

Rainbow F1

Nanto tipo morkos pereinančių spalvų šakniavaisiais. Morkos šiek tiek kūgiškos formos, ilgos. Jų spalva – tai visi atspalviai, nuo baltos spalvos pereinantys per geltoną iki oranžinės ir gelsvai rausvos. Tvirtus, sveikus lapus lengva surišti į ryšelius. Rekomenduojama auginti derliui ryšeliais, siekiant paįvairinti labai reiklią rinką. Dėl gana trumpo vegetacijos laikotarpio galima auginti tiek vasaros, tiek rudens derliui. Sandėliuojasi kelis mėnesius. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 95 dienos.

White Satin F1

Nanto tipo morkos baltos spalvos šakniavaisiais. Morkos šiek tiek kūgiškos formos, ilgos, lygios, gaivaus skonio, sultingos. Tinka tiek šviežiam vartojimui, tiek perdirbimui. Dėka tvirtų, sveikų lapų derlių galima parduoti ryšeliais. Dirva turėtų būti giliai ir gerai įdirbta, nes morkos užauga gan ilgos. Rekomenduojama sėti 1,0-1,4 mln. sėklų/ha. Vegetacijos trukmė 95 dienos.

Rainbow F1

White Satin F1

Bejo Zaden BV atstovė Lietuvoje UAB "Aista"
Jonavos g. 6-1, Kaunas 44269
Mob: 8 689 73688. Tel/Faks: 8 37 332122
El.p. info@aista.lt. www.aista.lt